

Conduite à tenir en laboratoire d'analyse de biologie médicale

Signalisation

- Disposer une signalétique « orientation du patient suspect Covid-19 » avant l'entrée dans le laboratoire pour vos patients
- Disposer une signalétique « gestes barrières » avant l'entrée et à plusieurs endroits dans le laboratoire

Tri des patients à l'entrée

- Mettre en place un circuit dédié pour les patients suspects Covid-19 dès l'entrée :
 - Demander systématiquement au patient la présence de signes d'infection respiratoire
 - Eviter son passage en salle d'attente
 - Envisager un éventuel regroupement géographique ou des plages horaires dédiées à ce type de patient (favoriser la prise de rendez-vous)

Prise en charge d'un patient symptomatique

- Reporter son analyse si non urgente (48 heures après l'arrêt des signes cliniques)
- Si impossible :
 - **Pour le patient :**
 - Port de masque chirurgical (à minima mouchoir pour lui dire de tousser et d'éternuer dedans)
 - Réalisation d'une friction hydroalcoolique (FHA) sinon un lavage des mains au savon doux
 - Information sur les gestes barrières : se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou éternue, se moucher dans un mouchoir à usage unique, le jeter et se laver les mains
 - Mise en place d'une distanciation à minima 1 mètre avec les autres patients
 - **Pour le professionnel de santé le prenant en charge :**
 - Prise en charge rapide du patient
 - FHA renforcée
 - Port de lunettes de protection
 - Port d'un masque chirurgical ou FFP2 si prélèvement aérosolisant (type prélèvement grippe naso-pharyngé), ne pas le mobiliser sinon FHA en suivant
 - Port de tablier en plastique à usage unique si possible
 - Port de gants dans le cadre des précautions standard. Si nécessaire, équipement de protection individuelle à retirer en premier et FHA immédiatement en suivant

Environnement / Matériel

- Entretien très régulier des surfaces fréquemment touchées ou souillées avec un détergent-désinfectant norme de virucidie NF EN 14476 ou nettoyage puis eau de javel ([mode d'emploi : https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/coronavirus/Eau_de_javel_v2.4.pdf](https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/coronavirus/Eau_de_javel_v2.4.pdf))
- Entretien des lunettes de protection si réutilisable après chaque utilisation ([protocole : http://cpias.chru-lille.fr/ActuCovid19/PEC%20lunettes%20de%20protection.pdf](http://cpias.chru-lille.fr/ActuCovid19/PEC%20lunettes%20de%20protection.pdf))
- Proscrire l'aspirateur et favoriser un balayage humide pour les sols
- Aération régulière des locaux
- Supprimer tout magazine, jouet ou autre objets inutiles et manipulables (accueil, salle d'attente...)

Déchets

- Prévoir des poubelles ouvertes (mouchoirs...) dans les zones accueil, salle d'attente...
- Équipement de protection individuelle en filière DASRI