HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Vous avez une prothèse de hanche ou de genou depuis moins d'un mois, soyez vigilant et repérez rapidement les signes d'une infection

L'INFECTION DANS LE MOIS SUIVANT L'IMPLANTATION D'UNE PROTHÈSE EST RARE MAIS GRAVE

Sachez identifier les signes d'une infection précoce

- Douleur, gonflement et parfois rougeur
- Cicatrice rouge, chaude, gonflée ou écoulement
- Fièvre ou frissons



C'est une **URGENCE** : prévenez rapidement l'équipe chirurgicale qui a posé la prothèse ainsi que votre médecin traitant

→ Plus l'infection est diagnostiquée tôt, moins il y aura de séquelles

Équipe médico chirurgicale :

Téléphone :

Adresse :

Médecin traitant :

QUELLES SUITES EN CAS D'INFECTION ?

Plus l'infection est traitée tôt, par une intervention chirurgicale et par des antibiotiques, moins il y aura de séquelles

- L'intervention chirurgicale est nécessaire pour nettoyer l'os et la prothèse.
- Un changement de prothèse est parfois nécessaire.
- L'intervention permet aussi de faire un prélèvement pour adapter le traitement antibiotique. Ce traitement est long entre **3 semaines et 6 mois.**

N'attendez pas pour calmer la douleur mais



- **Suivez rigoureusement la prescription** de l'ordonnance de sortie

- **Évitez toute automédication,** en particulier les anti-inflammatoires

Pour en savoir plus

- La recommandation sur le site de la HAS : www.has-sante.fr
- L'association le lien : www.lelien-association.fr

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

www.has-sante.fr

– Juillet 2014 –

© Haute Autorité de santé 2014